

## DOSIER-TABELLE für HEXAWOL® plus

VAH/ÖGHMP-Listung ist beantragt

**Allgemein**  
(Wischen mit hoher organischer Belastung)

Einwirkzeit	15 Min.	30 Min.	1 Std.	4 Std.
Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinigerlösung	1%	0,5%	0,5%	0,25%
1,0 Liter	10 ml	5 ml	5 ml	2,5 ml
<b>2,0 Liter</b>	<b>20 ml</b>	<b>10 ml</b>	<b>10 ml</b>	<b>5,0 ml</b>
3,0 Liter	30 ml	15 ml	15 ml	7,5 ml
<b>4,0 Liter</b>	<b>40 ml</b>	<b>20 ml</b>	<b>20 ml</b>	<b>10,0 ml</b>
5,0 Liter	50 ml	25 ml	25 ml	12,5 ml
<b>6,0 Liter</b>	<b>60 ml</b>	<b>30 ml</b>	<b>30 ml</b>	<b>15,0 ml</b>
7,0 Liter	70 ml	35 ml	35 ml	17,5 ml
<b>8,0 Liter</b>	<b>80 ml</b>	<b>40 ml</b>	<b>40 ml</b>	<b>20,0 ml</b>
9,0 Liter	90 ml	45 ml	45 ml	22,5 ml
<b>10,0 Liter</b>	<b>100 ml</b>	<b>50 ml</b>	<b>50 ml</b>	<b>25,0 ml</b>

**Hinweis:**

Die gesamte Desinfektionsreinigerlösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Desinfektionsreinigerkonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

**Beispiel:**

$$\begin{array}{l}
 10 \text{ L / } 0,5 \% \text{ ige Gebrauchslösung} = \\
 \quad 50 \text{ ml Desinfektionsreinigerkonzentrat} \\
 \quad + 9.950 \text{ ml Wasser} \\
 \hline
 = 10 \text{ L fertige Desinfektionsreinigerlösung}
 \end{array}$$

geprüft nach / gegen      Dosierung      Einwirkzeit

<b>VAH (ehem. DGHM) / ÖGHMP</b>	1%	15 Min.
hohe org. Belastung	0,50%	30 Min.
	0,50%	60 Min.
	0,25%	240 Min.
<b>Tuberkulose</b>	1%	60 Min.
<b>EN 1276 (bakterizid)</b>	1%	5 Min.
<b>EN 1650 (fungizid)</b>	0,50%	15 Min.
<b>EN 13697 (bakterizid)</b>	1,50%	5 Min.
hohe org. Belastung		
<b>EN 13697 (fungizid)</b>	1%	15 Min.
hohe org. Belastung		
<b>Influenza A (H1N1)</b>	1%	15 Min.
<b>Vaccinia Virus</b>		
hohe Belastung	2%	15 Min.
normale Anwendung	1,50%	30 Min.
<b>BVDV (Hepatitis C-Virus)</b>		
hohe Belastung	1%	5 Min.