

HEXAWOL® SANITÄR-DESINFEKTIONSREINIGER

- IHO-GELISTET
- RK-GELISTET
- HACCP- KONFORM

ART.-NR.:	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8295	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8298	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

ANWENDUNGSBEREICH

Der **HEXAWOL® SANITÄR-DESINFEKTIONSREINIGER** ist aufgrund seiner desinfizierenden Wirkung ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, sowie im Lebensmittel- und Schwimmbadbereich geeignet.

Aufgrund der hochaktiven Reinigungsformel auf Säurebasis wird bereits bei niedriger Einsatzkonzentration ein herausragendes Reinigungsergebnis erzielt. Sowohl für die Beseitigung von Kalk- und Wasserstein geeignet, als auch für die effektive Entfernung fettiger, ölig und eiweißhaltiger Rückstände. Ideal auch für den Einsatz in Schaumkanonen geeignet. Darüber hinaus wird die desinfizierende Wirkung gemäß den EN-Normen bestätigt, so dass der Reiniger den höchsten Standards im Gesundheitswesen entsprechen.

ANWENDUNG

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Fugen und Armaturen grundsätzlich mit kaltem Wasser vorwässern. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden. Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen!

DESINFIZIERENDE REINIGUNG

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig (ca. 15-20 ml/m²) benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät bearbeiten.

MASCHINELLE NASSREINIGUNG

200-400 ml zu 10 L kaltem Wasser

SCHAUMREINIGUNG

Produkt 1:1 mit kaltem Wasser verdünnt in den Behälter füllen, Düseneinstellung 10% wählen, Fläche einschäumen und nach ca. 10 Minuten mit klarem Wasser abspülen. Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.


INHALTSSTOFFE

<5% nichtionische Tenside, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Biozide, Farbstoffe

KENNZEICHNUNG

GEFAHR Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.



IM KONZENTRAT

1	2	3	4	5
IN ANWENDUNGSKONZENTRATION				

GISCODE GD 40



UFI: NWVC-J2A3-4Q7K-NU34

PM KW V01 07.2025

dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1
36396 Steinau an der Straße
TEL +49(0) 6663 970-230
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm-reinigungsmittel.de

HEXAWOL® SANITÄR-DESINFEKTIONSREINIGER

TRANSPORT (STRAßEN-/ SCHIENENTRANSPORT [GGVSEB/ADR/RID])

UN 3265 , Transportgefahrenklasse 8, Verpackungsgruppe II

PRODUKTSICHERHEIT

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Nur für den gewerblichen Gebrauch. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

BAuA-Nr.: N-112569

UFI: NWVC-J2A3-4Q7K-NU34

UMWELTSCHUTZ

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.
Interseroh _ LUCID: DE1360655885719

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

DOSIEREMPFEHLUNG FÜR DIE FLÄCHENDESINFEKTION IM GESUNDHEITSWESEN

Prüfmethode	Wirksamkeits-spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirk-zeit	Prüfkeime
EN 16615 / 4-Feldertest Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	hoch	2 %	200 ml/10 L	5 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	begrenzt viruzid*		1 %	100 ml/10 L	15 min	

DOSIEREMPFEHLUNG FÜR DIE FLÄCHENDESINFEKTION IM INDUSTRIELLEN, INSTITUTIONELLEN UND LEBENSMITTELBEREICH

Prüfmethode	Wirksamkeits- spektrum	Belastung	Dosierung	Einwirk- zeit	Prüfkeime	
Flächendesinfektion mit Mechanik						
EN 16615 / 4-Feldertest	bakterizid / levurozid	hoch	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	begrenzt viruzid*					
Flächendesinfektion ohne Mechanik						
EN 13697 Quantitativer Oberflächenversuch	bakterizid / levurozid	hoch	4 % 1 %	400 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	begrenzt viruzid*					

PM KW V01 07.2025

dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1
36396 Steinau an der Straße
TEL +49(0) 6663 970-230
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm-reinigungsmittel.de

HEXAWOL® SANITÄR-DESINFEKTIONSREINIGER

WEITERE PRÜFUNGEN

Prüfmethode	Wirksamkeits- spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirk- zeit	Prüfkeime
medizinischer Bereich						
EN 16615 / 4-Feldertest Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	hoch	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans
EN 13727 Quantitativer Suspensionsversuch	bakterizid	hoch	2 % 1 % 0,5 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L 50 ml/10 L	1 min 5 min 15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Quantitativer Suspensionsversuch	levurozid	hoch	0,5 % 0,1 %	50 ml/10 L 10 ml/10 L	1 min 5 min	Candida albicans
industrieller, institutioneller und Lebensmittelbereich						
EN 1276 Quantitativer Suspensionsversuch	bakterizid	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	1 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Quantitativer Suspensionsversuch	levurozid	hoch	1 %	100 ml/10 L	1 min	Candida albicans
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid	hoch	1 %	100 ml/10 L	5 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	levurozid	hoch	4 %	400 ml/10 L	5 min	Candida albicans
			1 %	100 ml/10 L	10 min	
Viruzidie						
EN 14476 Quantitativer Suspensionsversuch	begrenzt viruzid*	hoch	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 5 min	Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	begrenzt viruzid*	hoch	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 15 min	Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (MVA)
EN 14476 Quantitativer Suspensionsversuch	Warzenviren	hoch	2 % 1 %	200 ml/10 L 100 ml/10 L	5 min 5 min	Polyomavirus
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	Warzenviren	gering	2 %	200 ml/10 L	5 min	Polyomavirus
		hoch	2 %	200 ml/10 L	15 min	Polyomavirus

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de

PM KW V01 07.2025

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieser Produktinformation und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

dreiturm GmbH

Ilse-Wolf-Str. 1

36396 Steinau an der Straße

TEL +49(0) 6663 970-230

MAIL GV@dreiturm.de

WEB dreiturm-reinigungsmittel.de